



Information pour les patients

Caprelsa® (Vandetanib)

Caprelsa® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Caprelsa®?



Caprelsa® Comprimés pelliculés à 300 mg et 100 mg

Comprimés pelliculés à 300 mg : blancs de forme ovale, marqués « Z300 » d'un côté.

Comprimés pelliculés à 100 mg : blancs de forme ronde, marqués « Z100 » d'un côté.

Comment conserver Caprelsa®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Caprelsa® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Caprelsa®?

- Prenez les comprimés une fois par jour, de préférence à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés en entier. Ne pas les croquer, ni les casser, ou les écraser.
- Si vous avez des difficultés à avaler: vous pouvez dissoudre le comprimé dans un demi-verre d'eau non gazeuse en remuant (environ 10 minutes) avec une cuillère jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement obtenant ainsi une dispersion et l'avaler immédiatement. Après quoi, le rincer et le boire également de suite.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- Prendre la dose à posteriori dès que l'oubli est remarqué, si la dose suivante n'est pas prévue dans les 12 prochaines heures.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain à l'heure habituelle.

...j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.

- Soyez attentif à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Nausées/vomissements/perte d'appétit

- Prenez sans attendre les médicaments antinauséeux prescrits.
- Sans amélioration dans les 24h, prenez contact avec votre oncologue.

Éruption cutanée

- Procédez aux soins de la peau conformément aux instructions de l'équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté au préalable votre équipe soignante.

Maux de tête

- Les analgésiques habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de modification de la peau (éruption cutanée, rougeur).
- Si vous souffrez d'essoufflement et / ou de palpitations ou de vertiges, qui peuvent être associés à une toux et de la fièvre.
- Si vous souffrez d'un gonflement des jambes, de difficultés respiratoires
- Si vous souffrez de maux de tête, de vision floue ou de confusion.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant toute la durée du traitement protégez-vous en ne vous exposant pas directement au soleil, en portant des vêtements protégeant des rayons UV, en vous appliquant de la crème solaire à indice élevée sur toutes les zones non vêtues.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

