

Information pour les patients

Giotrif® (Afatinib)

Giotrif® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Giotrif® ?



Giotrif® : Giotrif® comprimés pelliculés à 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg.

Les comprimés pelliculés Giotrif® 20 mg sont ronds, blanc jaunâtre, marqués sur une face « T20 » et sur l'autre du logo Boehringer Ingelheim.

Les comprimés pelliculés Giotrif® 30 mg sont ronds bleu foncé marqués sur une face « T30 » et sur l'autre du logo Boehringer Ingelheim.

Les comprimés pelliculés Giotrif® 40 mg sont ronds bleu clair marqués sur une face « T40 » et sur l'autre du logo Boehringer Ingelheim.

Les comprimés pelliculés Giotrif® 50 mg sont ovales bleus marqués « T50 » d'un côté et du logo Boehringer Ingelheim de l'autre.

Comment conserver Giotrif® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Giotrif® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Giotrif® ?

- Prenez les comprimés pelliculés une fois par jour, de préférence à la même heure avec un verre d'eau.
- Les comprimés pelliculés doivent être pris à jeun, au moins 1 heure avant ou 3 heures après un repas.
- Vous pouvez dissoudre les comprimés pelliculés entiers dans un demi-verre d'eau non gazeuse en remuant avec une cuillère jusqu'à désintégration complète et prendre immédiatement. Dissoudre avec une cuillère jusqu'à dissolution complète. Boire de suite. Puis remplir le verre d'eau et le boire également.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- Vous pouvez prendre le comprimé oublié dès que possible le même jour, toutefois entre la dose habituelle du lendemain et la dose oubliée il doit s'écouler au moins 8 heures. Dans le cas contraire, la dose manquée ne doit pas être prise.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouveaux comprimés. Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Inflammation de la muqueuse buccale

- Plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas, se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (½ - 1 cuillère à café/litre d'eau).
- S'il n'y a pas d'amélioration et que l'apport de liquides et d'aliments est diminué et rendu difficile, contactez l'équipe de soins.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de soins.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de soins.

Photosensibilité et coups de soleil

- La peau est très sensible au soleil pendant la période de traitement.
- Portez des vêtements qui protègent du soleil et à l'extérieur restez autant que possible à l'ombre.
- Appliquez minutieusement sur la peau un écran solaire facteur 50.

Inflammation du lit de l'ongle

- Contactez votre équipe de soins.

Saignement de nez

- Contactez votre équipe de soins.

Irritation ou inflammation des yeux

- Si vous avez un larmoiement, une inflammation oculaire, une sensibilité à la lumière, une vision floue ou une douleur oculaire, informez votre équipe de soins.
- Portez toujours des lunettes de soleil au soleil.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la posologie normale du principe actif loperamide (Imodium®) avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez d'essoufflement, éventuellement associé à de la toux et de la fièvre.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, veillez à ne pas utiliser ces produits pendant le traitement.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.