



## Comment conserver Glivec® ?

Conserver à température ambiante.

## À quelle dose Glivec® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Glivec® ?

- Jusqu'à une dose quotidienne de 600 mg : prenez les comprimés une fois par jour, si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Prenez les comprimés avec un verre d'eau au moment des repas.
- Vous pouvez diviser les comprimés pelliculés.
- Si vous éprouvez des difficultés à déglutir : Vous pouvez dissoudre les comprimés entiers dans un verre d'eau gazeuse ou de jus de pomme (comprimés pelliculés 100 mg dans 1/2 dl, comprimés pelliculés 400 mg dans 2 dl) en remuant avec une cuillère jusqu'à ce qu'ils se dissolvent complètement. La suspension doit être avalée immédiatement en totalité.
- Pour des doses supérieures à 600 mg par jour, des recommandations spéciales s'appliquent.

## Qu'est-ce que je fais si ...

### ... dj'ai oublié le médicament ?

- Vous pouvez prendre le comprimé le même jour dès que possible.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

### ... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouvelles gélules.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

### ... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents ?

### Que puis-je faire ?

#### Œdèmes

- (Gonflement dû à la rétention de liquide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles et prise de poids rapide)
- Contactez immédiatement votre équipe de soins.

#### Mal de tête

- Demandez à votre médecin quel médicament vous pouvez prendre pour ces symptômes. Ne prenez pas de médicaments contenant du paracétamol.

## Éruption cutanée, rougeur de la peau

- Contacter votre équipe de soins.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de soins.

## Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.

## Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la posologie normale du principe actif lopéramide (Imodium®) avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- En cas de fièvre supérieure à 38 °C.
- Lors d'une modification de la peau tels qu'éruption cutanée, rougeur ou démangeaisons.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

## Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

### Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

## Que dois-je encore savoir ?

- Pendant le traitement ne prenez pas de préparations contenant du paracétamol (par ex. Panadol®, Dafalgan®, Acetalgin®, NeoCitran®, Pretuval®).
- Les produits suivants peuvent interférer avec l'effet du médicament : préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.