

Information pour les patients

Iclusig® (Ponatinib)

Iclusig® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Iclusig® ?



Iclusig® : Comprimés pelliculés à 15 mg et 45 mg.

Les comprimés pelliculés à 15 mg sont blancs, ronds et marqués « A5 » sur une face.

Les comprimés pelliculés à 30 mg sont blancs, ronds et marqués « C7 » sur une face.

Les comprimés pelliculés à 45 mg sont blancs, ronds et marqués « AP4 » sur une face.

Comment conserver Iclusig® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Iclusig® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Iclusig® ?

- Prenez les comprimés une fois par jour, de préférence à la même heure, avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés pelliculés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- Prenez le comprimé dès que possible le même jour.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Nausées / vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.

Éruption et sécheresse cutanées

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de soins.

Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de soin un laxatif approprié.

Fatigue

- Si vous êtes somnolent, soyez prudent lorsque vous conduisez des véhicules ou utilisez des machines dangereuses.

