

Information pour les patients

Kisplyx® (Lenvatinib)

Kisplyx® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Kisplyx® ?



Kisplyx® : gélules de 4 et 10 mg.

Kisplyx® à 4 mg est une gélule ovale rouge jaunâtre marquée dans sa partie supérieure « E » et dans sa partie inférieure « LENV 4 mg ».

Kisplyx® à 10 mg est une gélule ovale, dont la moitié rouge jaunâtre est marquée « E » et la moitié jaune marquée « LENV 10 mg ».

Comment conserver Kisplyx® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Kisplyx® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Kisplyx® ?

- Avalez les gélules avec un verre d'eau une fois par jour, si possible toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les gélules avec ou en dehors des repas.
- Avalez les gélules entières. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les ouvrir ou les écraser.
- Si vous avez des difficultés à avaler, vous pouvez mettre les gélules de Kisplyx® entières avec une cuillère à soupe d'eau ou de jus de pomme clair dans un petit flacon en verre qui puisse être fermé hermétiquement. Laissez les gélules reposer dans le liquide pendant environ 10 minutes, puis agitez bien jusqu'à dissolution des gélules. Buvez la suspension, puis ajoutez une autre cuillère à soupe d'eau ou de jus de pomme clair dans le récipient, à nouveau secouez bien et buvez le liquide.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- S'il reste 12 heures ou plus avant la prochaine dose, prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez et la dose suivante comme prévu.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouvelles gélules.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.
- Prenez note de la date.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas, se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 - 1 cuillère à café/litre d'eau).
- S'il n'y a pas d'amélioration et que l'apport de liquides et d'aliments est altérée et rendu difficile, contactez l'équipe de soins.

Mal de tête

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.
- Veillez à signaler impérativement ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de soin.

Rougeurs, cloques et douleurs sur les paumes des mains et plantes des pieds

- Dès le début du traitement, enduisez vos mains et pieds avec une crème ou une lotion grasse, si nécessaire utilisez une crème contenant de l'urée.
- Évitez les températures extrêmes (par ex. les mains dans l'eau chaude pendant un long moment).
- Évitez les pressions fortes (par ex. des chaussures serrées).
- En cas de douleur ou de cloques, arrêtez le traitement et contactez immédiatement votre médecin.

Chute des cheveux

- Demandez conseil à votre équipe soignante concernant les prothèses capillaires ou autre couvre-chefs appropriés.

Fatigue

- En cas de somnolence importante, soyez prudent lorsque vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines dangereuses.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations.
- Si votre tension artérielle s'élève ou si votre hypertension connue s'aggrave.
- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre, frissons, mal de gorge, toux ou rhume.
- Si vous souffrez de douleurs abdominales sévères.
- Si vous avez un saignement de nez ou du sang dans vos urines ou vos selles.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.