

Information pour les patients

Ninlaro® (Ixazomib)

Ninlaro® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Ninlaro®?



Ninlaro® Capsules dures à 2,3 mg, 3 mg et 4 mg.

Ninlaro® 2,3 mg: capsules rose pâle marquées „Takeda“ et „2,3 mg“.

Ninlaro® 3 mg: capsules gris clair marquées „Takeda“ et „3 mg“.

Ninlaro® 4 mg: capsules orange clair marquées „Takeda“ et „4 mg“.

Comment conserver Ninlaro®?

Conserver à une température ambiante.

À quelle dose Ninlaro® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Ninlaro®?

- Prenez les capsules à jeun avec un verre d'eau, au moins 1 heure avant ou au moins 2 heures après un repas, à peu près à la même heure de la journée.
- Avalez les capsules entières. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les ouvrir ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- Si la prochaine dose est prévue dans plus de 3 jours (72 heures) dans ce cas compenser la dose oubliée.
- Si la prochaine dose est prévue dans moins de 3 jours (72 heures), ne rattrapez pas la dose oubliée.
- Prenez la prochaine dose prévue comme prévu.
- Notez la date de l'oubli.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsule. Prenez la prochaine dose comme prévu.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante (environ 2 litres par jour d'eau, de thé ou de bouillon).

Constipation

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

Nausées et vomissement

- Prenez les médicaments anti-nauséeux prescrits sans attendre.

Éruption cutanée

- Effectuez les soins de peau conformément aux instructions de l'équipe soignante.
- De manière précoce, appliquez la crème prescrite ou prenez selon prescription le médicament par voie orale (comprimé / capsule).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous saignez du nez ou si vous avez une tendance accrue aux contusions.
- Si vous présentez des signes d'infections tels que fièvre, frissons, maux de gorge ou une toux ou un rhume.
- Si vos bras ou vos jambes sont enflés ou si vous souffrez de difficultés respiratoires.
- Si vous ressentez un engourdissement, des picotements ou des brûlures dans les mains ou les pieds.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles peu clairs.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, ne prenez pas ces produits pendant le traitement.