

Information pour les patients

Puri-Nethol® (Mercaptopurin)

Puri-Nethol® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Puri-Nethol®?



Puri-Nethol® Comprimés à 50 mg, beiges, comprimés ronds, marqués « GX » et « BX 2 » en relief sur l'une des faces, séparés par une ligne en sillon.

Comment conserver Puri-Nethol®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Puri-Nethol® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Puri-Nethol®?

- Les comprimés doivent être pris à jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les dissoudre ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose oubliée ultérieurement. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note la date de l'oubli.
- Contactez votre équipe soignante pour programmer la prochaine dose.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie à l'heure indiquée, comme d'habitude le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez sans attendre, les médicaments antinauséux prescrits.
- Si vous ressentez une augmentation des symptômes ou s'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous présentez des signes d'infections tels que fièvre, frissons, maux de gorge ou une toux ou un rhume.
- Si vous souffrez de nausées et/ou de vomissements persistants.
- En cas de saignement (p.ex. saignements de nez) ou petites taches cutanées de couleur rouge sur le corps
- Si la peau et le blanc des yeux sont jaunâtres, l'urine foncée, ainsi qu'en cas de fatigue sévère et de perte d'appétit
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : octobre 2020
Référence : www.swissmedicinfo.ch