

Information pour les patients

Tagrisso® (Osimertinib)

Tagrisso® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Tagrisso®?



Tagrisso® Comprimés pelliculés à 80 mg et 40 mg.

Les comprimés de Tagrisso® à 80 mg sont beiges, ovales, biconvexes, mesurant 7,25 × 14,5 mm et portant les mentions „AZ“ et „80“ en relief sur l'une de leur face.

Les comprimés de Tagrisso® à 40 mg sont beiges, ronds et biconvexes d'un diamètre de 9 mm, portant l'inscription „AZ“ et „40“ sur l'une de leur face.

Comment conserver Tagrisso®?

Conserver à une température ambiante.

À quelle dose Tagrisso® doit-il être utilisé?

Prenez les comprimés selon la posologie prescrite par votre médecin. Le dosage est généralement de 80 mg une fois par jour.

Comment dois-je prendre Tagrisso®?

- Prenez les comprimés en une fois par jour avec un verre d'eau, de préférence à la même heure.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers, ne pas les mâcher, les casser ou les écraser.
- Si vous avez de la difficulté à avaler, vous pouvez dissoudre les comprimés entiers dans un demi-verre d'eau non gazeuse en remuant avec une cuillère jusqu'à dissolution complète, boire de suite, puis remplir le verre d'eau et le boire également.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- Prenez note de la date de l'oubli.
- Prenez la dose oubliée, sauf s'il reste moins de 12 heures avant la prochaine dose prévue.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Inflammation de muqueuse buccale

- Rincez-vous la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2-1 cuillère à café/litre d'eau) au moins après chaque repas.
- Sans amélioration et que boire ou s'alimenter devient difficile, veuillez prendre contact avec votre équipe soignante.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de peau selon les instructions de l'équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté au préalable votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si l'aspect de la peau change tel que l'apparition de rougeur ou de boutons.
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations, éventuellement associés à de la toux et de la fièvre.
- Si vous êtes gêné par des lésions rugueuses ou de blessures dans la bouche.
- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (p.ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules / comprimés par jour.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de produits à base de millepertuis. Ces produits et leurs dérivés peuvent interférer avec l'effet du médicament et son efficacité. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- En raison du risque de malformations congénitales chez les enfants à naître, les femmes en âge de procréer et les hommes avec des partenaires en âge de procréer doivent utiliser une contraception sûre pendant la prise de Tagrisso® et jusqu'à 4 mois après la fin du traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.