



## Information pour les patients

# Venclyxto® (Venetoclax)

Venclyxto® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

## Comment se présente Venclyxto®?



Venclyxto® Comprimés pelliculés respectivement de 10 mg, 50 mg et 100mg.

Comprimés pelliculés respectivement de 10 mg, 50 mg et 100mg.

Les comprimés de Venclyxto® à 10 mg sont jaune-clair, ronds, gravés d'un côté par un „V“ et sur l'autre face par un „10“.

Les comprimés de Venclyxto® à 50 mg sont rouges, oblongs, marqués d'un côté d'un „V“ et de l'autre côté d'un „50“.

Les comprimés de Venclyxto® à 100 mg sont jaune-clair, oblongs, marqués d'un côté d'un „V“ et de l'autre côté d'un „100“.

## Comment conserver Venclyxto®?

Conserver à température ambiante.

## À quelle dose Venclyxto® doit-il être utilisé?

Selon la dose prescrite par votre médecin.

## Comment dois-je prendre Venclyxto®?

- Prenez les comprimés une fois par jour, de préférence le matin à la même heure chaque jour, avec un verre d'eau.
- Prenez les comprimés de la dose quotidienne prescrite en une fois avec de la nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, les casser ou les écraser.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament?

- Vous pouvez prendre la dose oubliée jusqu'à 8 heures après l'heure de prise habituelle.
- La dose suivante est prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

### ...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain sans changement selon la prescription.

### ...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents?

### Que puis-je faire?

#### Nausées, vomissements

- Prenez sans attendre les médicaments antinauséeux prescrits.
- Sans amélioration dans les 24h, prenez contact avec votre médecin.

## **Diarrhées**

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Pour une diarrhée légère, essayez d'ajuster votre alimentation avec du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante (environ 2 litres par jour d'eau, de thé ou de bouillon).

## **Constipation**

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

## **Quand dois-je informer mon équipe soignante?**

- Si vous présentez des signes d'infections tels que de la fièvre > à 38°C, des frissons, un mal de gorge ou une toux ou un rhume.
- En cas de fatigue intense et croissante.
- En cas d'essoufflement ou de troubles du rythme cardiaque.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

## **Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.**

**Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.**

## **Que dois-je encore savoir?**

- Les préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis peuvent interférer avec les effets du médicament, c'est pourquoi vous devez renoncer à ces produits pendant le traitement.
- Buvez au moins 1,5 à 2 litres d'eau/jour, deux jours avant le début du traitement et jusqu'à la fin de la première phase de la thérapie. Ceci aide à éliminer les cellules tumorales détruites de votre corps.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.