

Comment conserver Zydelig® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Zydelig® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Zydelig® ?

- Prenez les comprimés prescrits le matin et le soir, avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, les casser ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- Une dose manquée peut être prise dans les 6 heures qui suit l'heure prévue.
- Après plus de 6 heures, la dose manquée ne doit pas être rattrapée.
La dose suivante doit être prise à l'heure habituelle.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Nausées / vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe de soins.

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- En cas de douleurs abdominales.
- Si vous avez une fièvre de plus de 38°C.
- Si vous souffrez de toux ou d'essoufflement.
- Si vous avez une coloration jaune de la peau ou des yeux, ou une coloration brune des urines.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'efficacité du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.