



Information pour les patients

Zykadia® (Ceritinib)

Zykadia® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Zykadia®?



Zykadia® Capsule dure à 150mg.

Les capsules de Zykadia® à 150 mg sont de forme allongée, bleu-clair et blanche, portant l'inscription « LDK 150 mg » sur la moitié bleu-clair et « NVR » sur la moitié blanche.

Comment conserver Zykadia®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Zykadia® doit-il être utilisé?

Selon la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Zykadia®?

- Prenez les capsules avec un verre d'eau, pendant un repas de préférence à la même heure chaque jour. Il peut prendre la forme d'une collation ou d'un repas complet.
- Avalez les capsules entières. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les disoudre, ni les ouvrir ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose oubliée plus tard. La dose suivante est prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de capsule après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain à l'heure habituelle.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez sans attendre les médicaments antinauséeux prescrits.
- Sans amélioration dans les 24h, prenez contact avec votre oncologue.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Constipation

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

Douleurs abdominales

- Les analgésiques en vente libre habituels (par exemple le paracétamol) sont autorisés.

Éruptions cutanées

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans consulter au préalable votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si une modification de la peau (éruption, rougeur) se produit.
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations.
- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la dose normale de la substance active lopéramide (par exemple Imodium®) avec un maximum de 8 capsules / comprimés par jour.
- En cas de troubles visuels persistants.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres symptômes peu clairs.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Les patients sous Zykadia® sont souvent fatigués, et leur capacité à conduire ou à faire fonctionner des machines dangereuses peut être limitée.
- Les préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis peuvent interférer avec les effets du médicament, c'est pourquoi vous devez renoncer à ces produits pendant le traitement.
- Les médicaments qui inhibent l'acidité de l'estomac peuvent interférer avec l'effet du médicament. Vous ne devez pas prendre de tels médicaments sans consulter votre médecin.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.