

Information pour les patients

Imbruvica® (Ibrutinib)

Imbruvica® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Imbruvica®?



Imbruvica® Comprimés pelliculés à 140 mg, 280 mg, 420 mg et 560 mg

Comprimé pelliculé Imbruvica® à 140 mg: jaune-vert à vert, rond, portant l'inscription „ibr“ d'un côté et „140 mg“ de l'autre.

Comprimé pelliculé Imbruvica® à 280 mg: pourpre, oblong, marqué „ibr“ d'un côté et „280 mg“ de l'autre.

Comprimé pelliculé Imbruvica® à 420 mg: jaune-vert à vert, oblong, marqué „ibr“ sur un côté et „420 mg“ de l'autre.

Comprimé pelliculé Imbruvica® à 560 mg: jaune à orange, oblong avec marqué „ibr“ sur un côté et „560 mg“ sur l'autre face.

Comment conserver Imbruvica®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Imbruvica® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Imbruvica®?

- Prenez les comprimés prescrits avec un verre d'eau, une fois par jour environ à la même heure et ne soyez pas entièrement à jeun.
- Avalez les comprimés en entier avec de l'eau sans les mâcher, les casser ou les morceler.
- Lors de la prise des médicaments, ne mélangez pas les comprimés Imbruvica® avec les capsules Imbruvica®. Prenez soit les comprimés, soit les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Le même jour, prenez le comprimé dès que possible.
- Le lendemain, poursuivez la thérapie comme d'habitude.
- Ne prenez jamais deux doses le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimés après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie à l'heure indiquée, comme d'habitude.

...j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausées, vomissement

- Prenez les médicaments antinauséeux prescrits le plus tôt possible.
- Sans amélioration dans les 24h, prenez contact avec votre oncologue.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.

- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Constipation

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

Douleurs articulaires, musculaires et maux de tête

- Ne prenez des analgésiques qu'après avoir consulté votre médecin traitant.
- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe soignante d'autres mesures appropriées.

Éruption cutanée, rougeur cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.

Vertiges

- Soyez prudent lorsque vous vous levez. Si les symptômes persistent, contactez l'équipe soignante.

Tachycardie ou œdème

- Œdème: gonflement dû à la rétention de liquide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles - et à une prise de poids rapide.
- Contactez l'équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38° C ou de saignement.
- En cas de maux de tête sévères, de fatigue accrue ou de troubles de la locomotion.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber du pamplemousse ni des préparations à base de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament et son efficacité. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- Les compléments alimentaires tels que les graines de lin, l'huile de poisson ou les préparations de vitamine E doivent être évités en raison d'effets indésirables accrus.
- Les femmes ne devraient pas tomber enceintes pendant qu'elles prennent Imbruvica® et pendant au moins 1 mois après la fin du traitement. En cas d'utilisation d'une méthode contraceptive hormonale, il est recommandé d'utiliser une méthode barrière en plus. Il est déconseillé aux hommes de concevoir des enfants pendant et jusqu'à 3 mois après le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: octobre 2020

Référence : www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse