

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia di Imbruvica®. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Imbruvica®.
- Durante la terapia con Imbruvica® sono controindicati integratori alimentari che possono aumentare il rischio di sanguinamenti quali semi di lino, olio di pesce o preparati contenenti vitamina E.
- Imbruvica® può determinare malformazioni del nascituro. Le donne in età fertile devono pertanto adottare un metodo anticoncezionale altamente efficace per tutta la durata della terapia con Imbruvica® e nel mese successivo per evitare una gravidanza. Si raccomanda di associare un metodo di barriera all'anticoncezionale ormonale. Gli uomini non devono concepire un figlio durante l'assunzione della terapia con Imbruvica® e nei tre mesi successivi alla conclusione del trattamento.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: dicembre 2020

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera

Informazioni riassuntive per il paziente

Imbruvica® (Ibrutinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Imbruvica®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla
terapia.

Che aspetto ha Imbruvica®?



Imbruvica® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 140 mg, 280 mg, 420 mg o 560 mg di principio attivo.

La compressa da 140 mg è giallo-verde, rotonda, con la dicitura «ibr» impressa su un lato e il numero «140» sull'altro lato.

La compressa da 280 mg è porpora, ovale, con la dicitura «ibr» impressa su un lato e il numero «280» sull'altro lato.

La compressa da 420 mg è giallo-verde, ovale, con la dicitura «ibr» impressa su un lato e il numero «420» sull'altro lato.

La compressa da 560 mg è arancione-giallo, ovale con la dicitura «ibr» impressa su un lato e il numero «560» sull'altro lato.

Come si conserva Imbruvica®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Imbruvica®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Imbruvica®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua, ma non a stomaco completamente vuoto.
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.
- Importante: Non confonda le compresse con le capsule.
Si assumono sempre o le compresse o le capsule, mai entrambe insieme.

Che cosa faccio se ...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il giorno stesso il più presto possibile.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea/il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p.es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Dolori articolari e muscolari, mal di testa

- Assuma esclusivamente antidolorifici che Le sono stati prescritti dal medico.
- Se i sintomi persistono, contatti l'équipe curante.

Eruzioni cutanee, arrossamenti della pelle

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.

Capogiri (vertigini)

- Faccia attenzione quando si alza.
- Se i sintomi persistono, contatti l'équipe curante.

Palpitazioni o edemi

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C o sanguinamenti.
- Forte mal di testa, aumento o persistenza della stanchezza o disturbi del movimento.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.