

Informazioni riassuntive per il paziente

Iclusig® (Ponatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Iclusig®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Iclusig®?



Iclusig® è disponibile in compresse rivestite con film da 15mg, 30mg e da 45 mg:
La compressa da 15 mg è bianca, rotonda con la dicitura "A5" impressa su un lato.
La compressa da 30 mg è bianca, rotonda con la dicitura "C7" impressa su un lato.
La compressa da 45 mg è bianca, rotonda con la dicitura "AP4" impressa su un lato

Come si conserva Iclusig®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Iclusig®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Iclusig®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Le compresse possono essere prese con o senza cibo.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso lo stesso giorno.
- Non assuma mai il doppio della dose giornaliera prescritta nello stesso giorno.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendomi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

Eruzioni cutanee, pelle secca

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Stanchezza

- In caso di stanchezza può pertanto ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

Dolori ossei, articolari, muscolari alla schiena, alle estremità o crampi muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica.

Edemi alle braccia e/o alle gambe

- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.
- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Segni d'infezione come febbre >38 °C, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- In caso di sanguinamenti.
- Comparsa di dolori addominali.
- Gonfiori alle gambe e/o respiro corto.
- Dolori al petto e/o palpitazioni.
- In caso di disturbi/sintomi agli occhi o sensoriali (formicolio, intorpidimento, bruciore, sensazione di pressione etc.).
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono interferire sull'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Iclusig®.
- I farmaci che proteggono la mucosa dello stomaco (gastroprotettori) possono ridurre l'efficacia di Iclusig®. Si astenga pertanto dall'impiego contemporaneo di gastroprotettori o consulti in ogni caso prima il Suo medico.
- Durante il trattamento deve essere utilizzato un metodo contraccettivo efficace sia per gli uomini che per le donne.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: novembre 2021

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera