

Information pour les patients

Kisqali® (Ribociclib)

Kisqali® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Kisqali®?



Kisqali® Comprimé pelliculé à 200mg

Comprimé pelliculé à 200 mg : de couleur gris clair-violet de forme ronde, gravés d'un côté avec « RIC » en relief et sur l'autre face avec « NVR».

Comment conserver Kisqali®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Kisqali® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Kisqali®?

- Kisqali® doit être pris à la même heure chaque jour, de préférence le matin, avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés entiers. Ne pas les mâcher, ni les casser, ou les écraser.
- Les comprimés qui ne se présentent pas dans leur forme intégrale ne doivent pas être pris.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose oubliée plus tard. La dose suivante est prise à l'heure habituelle le lendemain.
- Notez la date de l'oubli du comprimé.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain sans changement selon la prescription.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments antinauséeux prescrits sans attendre.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante (environ 2 litres par jour d'eau, de thé ou de bouillon).

Constipation

- Si les symptômes de constipation persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

Maux de tête et de dos

- Les analgésiques en vente libre habituels sont autorisés.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38 ° C.
- En cas de signes infectieux tels que maux de gorge ou aphtes.
- En cas de fatigue importante et croissante.
- Si vous avez des démangeaisons, la peau ou le blanc des yeux qui jaunissent.
- Si vous avez des difficultés à respirer ou à avaler.
- Si vous avez des palpitations, des vertiges ou des jambes gonflées.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables ou si vous avez d'autres questions.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Ne prenez pas de médicaments (y compris en vente libre) contre d'éventuels effets secondaires sans en parler à votre médecin. Ces produits peuvent interférer avec les effets du médicament.
- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber du pamplemousse ni des préparations à base de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament et son efficacité. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.

