

Informazioni riassuntive per il paziente

Kisqali® (Ribociclib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Kisqali®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Kisqali®?



Kisqali® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 200 mg di principio attivo. Di colore viola grigiastra chiara, rotonda con impresso «RIC» su un lato e «NVR» sull'altro.

Come si conserva Kisqali®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Kisqali®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Kisqali®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta, una volta al giorno, di preferenza al mattino e se possibile sempre alla stessa ora.
- Indipendente dai pasti con un bicchiere d'acqua.
- Non divida, sciolga o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.
- Compresse non più intatte vanno eliminate. La loro assunzione potrebbe essere dannosa.

Che cosa faccio se ...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco. Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarle un lassativo idoneo.

Mal di testa e mal di schiena

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Infezioni accompagnate da sintomi come, per esempio, infiammazione della gola o ulcere in bocca.
- In caso di affaticamento grave e crescente.
- Prurito cutaneo, pelle di colore giallo o ingiallimento del bianco degli occhi.
- Respirazione o deglutizione difficoltose.
- Palpitazioni, giramenti di testa o gambe gonfie.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.
- Qualsiasi dubbio o perplessità.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Non assuma alcun farmaco per contrastare eventuali effetti secondari di Kisqali® senza aver prima consultato il Suo medico. Tale raccomandazione vale anche per i farmaci, non soggetti a prescrizione medica e reperibili senza ricetta.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia di Kisqali®. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Kisqali®.

