

Informazioni riassuntive per il paziente

Lanvis® (Thioguanin)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Lanvis®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Lanvis®?



Lanvis® è disponibile in compresse contenenti 40 mg di principio attivo, a forma di dischetto e di colore bianco. Sulla parte anteriore è impressa la dicitura «T40».

Come si conserva Lanvis®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Lanvis®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Lanvis®?

- Assuma le compresse a digiuno, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto.
- Assuma le compresse se possibile sempre alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Proseguo la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco all'ora prestabilita.
- Non assumo mai il doppio della dose giornaliera prescritta nello stesso giorno.
- Annoto la data in cui ho dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assumo il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo all'ora prestabilita.
- Annoto la data.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata dopo ogni pasto e, se possibile, anche tra i pasti (½-1 cucchiaino da tè di sale per 1 litro di acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione delle mucose orali non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Nausea e/o vomito persistenti.
- Perdita di sangue dal naso, lividi sulla pelle e altri tipi di sanguinamento.
- Pelle di colore giallo o ingiallimento del bianco degli occhi, urine scure, feci chiare, stanchezza e inappetenza.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Lanvis® aumenta la sensibilità ai raggi solari. Indossi indumenti protettivi e cosparga la pelle esposta al sole di crema con un alto fattore di protezione solare (50).
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.
La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: dicembre 2020
Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch