

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations.
- Si votre tension artérielle s'élève ou si votre hypertension connue s'aggrave.
- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre, frissons, mal de gorge, toux ou rhume.
- Si vous souffrez de douleurs abdominales sévères.
- Si vous avez un saignement de nez ou du sang dans vos urines ou vos selles.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexpliqués.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Information pour les patients

Lenvima® (Lenvatinib)

Lenvima® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Lenvima® ?



Lenvima® : gélules de 4 et 10 mg.

Lenvima® à 4 mg est une gélule ovale rouge jaunâtre marquée dans sa partie supérieure « E » et dans sa partie inférieure « LENY 4 mg ».

Lenvima® à 10 mg est une gélule ovale, dont la moitié rouge jaunâtre est marquée « E » et la moitié jaune marquée « LENY 10 mg ».

Comment conserver Lenvima® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Lenvima® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Lenvima® ?

- Avalez les gélules avec un verre d'eau une fois par jour, si possible toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les gélules avec ou en dehors des repas.
- Avalez les gélules entières. Ne pas les mâcher, ni les casser, ni les ouvrir ou les écraser.
- Si vous avez des difficultés à avaler, Vous pouvez dissoudre les gélules entières avec une cuillère à soupe d'eau ou de jus de pomme en remuant avec une cuillère jusqu'à ce qu'elles soient complètement dissoutes. Buvez la suspension, puis ajoutez une autre cuillère à soupe du liquide dans le verre, remuez et buvez.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- S'il reste 12 heures ou plus avant la prochaine dose, prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez et la dose suivante comme prévu.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Nausées, vomissements, perte d'appétit

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas, se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (½ - 1 cuillère à café/litre d'eau).
- S'il n'y a pas d'amélioration et que l'apport de liquides et d'aliments est altérée et rendu difficile, contactez l'équipe de soins.

Mal de tête

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.
- Veillez à signaler impérativement ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de soin.

Rougeurs, cloques et douleurs sur les paumes des mains et plantes des pieds

- Dès le début du traitement, enduisez vos mains et pieds avec une crème ou une lotion grasse, si nécessaire utilisez une crème contenant de l'urée.
- Évitez les températures extrêmes (par ex. les mains dans l'eau chaude pendant un long moment).
- Évitez les pressions fortes (par ex. des chaussures serrées).
- En cas de douleur ou de cloques, arrêtez le traitement et contactez immédiatement votre médecin.

Chute des cheveux

- Demandez conseil à votre équipe soignante concernant les prothèses capillaires ou autre couvre-chefs appropriés.

Fatigue

- En cas de somnolence importante, soyez prudent lorsque vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines dangereuses.