

Information pour les patients

Lonsurf® (Trifluridin)

Lonsurf® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Lonsurf® ?



Lonsurf®: Comprimés pelliculés à 15 et 20 mg

Comprimé pelliculé Lonsurf® à 15 mg : rond, blanc, marqué d'un côté avec «15 » et de l'autre avec «102 » et «15mg ».

Comprimé pelliculé Lonsurf® à 20 mg : rond, rouge pâle, marqué d'un côté avec «20 » et de l'autre avec «102 » et «20mg».

Comment conserver Lonsurf®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Lonsurf® doit-il être utilisé?

- Selon la prescription de votre médecin.
- La prise est habituellement effectuée du 1^{er} au 5^{ème} jour et du 8^{ème} au 12^{ème} jour de chaque cycle de 28 jours.

Comment dois-je prendre Lonsurf®?

- Prenez Lonsurf® deux fois par jour dans l'heure suivant le petit-déjeuner et après le dîner (repas du soir).
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau.
- Ne pas mâcher, casser ou écraser les comprimés.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament?

- Ne reprenez pas la dose oubliée ultérieurement.
- Poursuivez la thérapie à l'heure habituelle.
- Prenez note de la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas le comprimé après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie à l'heure indiquée, comme d'habitude.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Perte d'appétit et perte de poids

- Dans ce cas il peut être bénéfique de fractionner ses repas en plusieurs petites portions, et choisir des plats qui vous plaisent.
- En cas de perte d'appétit prolongée, contactez votre équipe soignante.

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Altération du goût

- Discutez des changements de goût prononcés avec votre équipe soignante. Une consultation nutritionnelle pourrait être utile.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38° C.
- Si vous présentez des signes d'infections tels que fièvre, frissons, maux de gorge ou une toux ou un rhume.
- Si la diarrhée n'est pas améliorée ou enrayée avec la prise de loperamide (p.ex. Imodium®) à une posologie normale jusqu'à 8 capsules ou comprimés/ jour.
- En cas de saignement, par exemple du nez ou des gencives.
- En cas de fatigue sévère et croissante.
- En cas de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: octobre 2020
Référence : www.swissmedicinfo.ch