

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber du pamplemousse ni des préparations à base de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament et son efficacité. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- Les patients sont souvent fatigués sous Lynparza®, l'aptitude à conduire ou faire fonctionner des machines dangereuses peut être limitée.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : octobre 2020
Référence : www.swissmedinfo.ch

Information pour les patients

Lynparza® Comprimés (Olaparib)

Lynparza® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Lynparza®?



Lynparza® Comprimés pelliculés 100 mg et 150 mg

Comprimés pelliculés ovales à 100 mg: jaune, marqués d'un côté avec « OP100 ».

Comprimés pelliculés ovales à 150 mg: gris/vert, marqués d'un côté avec « OP150 ».

Comment conserver Lynparza®?

Conserver à une température ambiante.

À quelle dose Lynparza® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Lynparza®?

- Prenez les médicaments prescrits matin et soir (2 fois par jour).
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Avalez les comprimés en entier. Ne pas les mâcher, ni les diviser, ou les écraser.

IMPORTANT:

- Lors de la prise des médicaments, ne mélangez pas les comprimés Lynparza® avec les capsules Lynparza®. Prenez soit les comprimés, soit les capsules.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- La dose oubliée n'est pas prise plus tard.
- Poursuivez la thérapie à l'heure indiquée, comme d'habitude.
- Prenez note de cette date d'oubli.

...j'ai vomi le médicament?

- Prenez la prochaine dose prévue comme prévu.
- Notez cette date. Si c'est en 2 prises quotidiennes!

...j'ai pris trop de comprimés/capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Nausée/vomissements

- Prenez les médicaments antinauséeux prescrits le plus tôt possible.
- Sans amélioration dans les 24h, prenez contact avec votre oncologue.

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Pour une diarrhée légère, essayez d'ajuster votre alimentation avec du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante (environ 2 litres par jour d'eau, de thé ou de bouillon).

Maux de tête

- Les analgésiques habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincez vous la bouche après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 à 1 cuillère à thé de sel par litre d'eau). S'il n'y a pas d'amélioration et/ou si la consommation de liquides et de nourriture est réduite, contactez l'équipe soignante.

Vertiges

- Prenez contact avec votre équipe soignante.

Changement du goût

- Un goût amer ou métallique peut apparaître. Vous pouvez sucer des bonbons sans sucre. Essayez de consommer des aliments qui vous font plaisir.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles peu clairs.
- Si vous avez une fièvre supérieure à 38 °C.
- En cas de saignement, p. ex. saignement de nez, saignement des gencives.
- Si vous souffrez d'essoufflement ou de toux.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations vous prenez, y compris ceux à base de plantes.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.