

Che cos'altro devo sapere?

- L'erba di San Giovanni (o iperico) può ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tale sostanza durante la terapia con Odomzo®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Medico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: dicembre 2020

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera

Informazioni riassuntive per il paziente

Odomzo® (Sonidegib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Odomzo®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla
terapia.

Comment se présente Odomzo®?



Odomzo® è disponibile in capsule da 200 mg, di colore rosso mattone, con le diciture «NVR» e «Sonidegib 200 mg» contrassegnate in inchiostro nero rispettivamente sulla testa e sul corpo della capsula.

Come si conserva Odomzo®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Odomzo®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Odomzo®?

- Assuma la capsula, una volta al giorno se possibile sempre alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Assuma le compresse a digiuno, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto.
- Le capsule devono essere inghiottite intere, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso entro 6 ore.
- Altrimenti attenda il giorno successivo e assuma la dose giornaliera prescritta all'ora prestabilita.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia, attenendosi al piano di terapia.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Perdita di capelli

- Chieda consiglio alla Sua équipe curante in merito a parrucche e altri copri capi adatti.

Crampi e dolori muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica.
- Riferisca tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Prurito

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

Stanchezza

- La stanchezza può ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.