

Information pour les patients

Tafinlar® (Dabrafenib)

Tafinlar® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Tafinlar® ?



Tafinlar® : Gélules à 50 mg et 75 mg.

Tafinlar® à 50 mg est une gélule rouge foncé, marquée sur l'une de sa moitié « 50 mg » et sur l'autre moitié « BS TEW ».

Tafinlar® à 75 mg est une gélule de couleur vieux rose, marquée sur l'une de sa moitié « 75 mg » et sur l'autre moitié « BS LHF ».

Comment conserver Tafinlar® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Tafinlar® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Tafinlar® ?

- Prendre les gélules prescrites matin et soir à un intervalle d'environ 12 heures.
- Les gélules doivent être prises à jeun, c'est-à-dire au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Avalez les capsules entières. Ne pas les mâcher ou les casser, les ouvrir ni les écraser.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- La dose manquée ne sera pas prise plus tard s'il reste moins de 6 heures avant la prochaine dose prévue.
- La dose suivante sera prise à l'heure prévue le soir même ou le lendemain matin.
- Prenez note de la date de l'oubli

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouvelles gélules.
- Poursuivez le traitement sans changement le soir même ou le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du lopéramide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon). Contactez votre médecin.

Chute des cheveux (occasionnelle et légère)

- Demandez conseil à votre équipe soignante concernant les prothèses capillaires ou autre couvre-chefs appropriés.

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.
- Veillez à signaler ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Éruption cutanée

- Effectuer les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.

Fatigue

- En cas de somnolence importante, soyez prudent lorsque vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines dangereuses.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Conjonctivite

- Appliquez des gouttes hydratantes pour les yeux plusieurs fois par jour.
- Portez des lunettes de soleil à l'extérieur.
- Les paupières enflammées et qui démangent peuvent être apaisées par des compresses froides.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- En cas de fièvre de plus de 38°C.
- Si vous remarquez des signes d'infection, tels que des frissons, un mal de gorge de la toux ou un rhume.
- Si vous ressentez des douleurs thoraciques, un essoufflement et/ou des palpitations.
- Si vous avez des difficultés à avaler.
- Si vous ressentez une douleur abdominale sévère.
- En cas d'inflammation ou rougeur de l'œil.
- En cas d'apparition d'une lésion ou grosseur sur la peau.
- Si vous avez un mal de tête important.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- En raison du risque de malformations chez l'enfant à naître, il est essentiel que les femmes utilisent une contraception stricte pendant le traitement par Tafinlar® et jusqu'à 4 semaines après l'arrêt de celui-ci. L'utilisation de préservatifs est recommandée en raison des interactions possibles avec la pilule contraceptive.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.