



## Informazioni riassuntive per il paziente

# Venclyxto® (Venetoclax)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Venclyxto®.  
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

## Che aspetto ha Venclyxto®?



Venclyxto® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 10 mg, 50 mg o 100 mg di principio attivo.

La compressa da 10 mg è giallo pallido, rotonda con la dicitura «V» impressa, su un lato e «10» sull'altro.

La compressa da 50 mg è beige, oblunga con la dicitura «V» impressa su un lato e «50» sull'altro.

La compressa da 100 mg è giallo pallido, oblunga con la dicitura «V» impressa su un lato e «100» sull'altro.

## Come si conserva Venclyxto®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Venclyxto®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Venclyxto®?

- Assuma la dose prescritta una volta al giorno, all'incirca alla stessa ora ogni giorno, con un bicchiere d'acqua.
- Assuma le compresse durante un pasto (di preferenza durante la colazione).
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata entro 8 ore dal consueto orario di somministrazione. Se ciò non fosse possibile, tralasci la dose dimenticata.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma una dose doppia, durante lo stesso giorno, per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo all'ora prestabilita.

### ...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e il vomito perdurassero oltre 24 ore.

## **Diarrea**

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

## **Stitichezza**

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## **Che cosa devo segnalare all'équipe curante?**

- Segni d'infezione come febbre  $>38^{\circ}\text{C}$ , brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- In caso di affaticamento grave e crescente.
- Sensazione di mancanza di respiro o battito cardiaco irregolare.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

## **Che cos'altro devo sapere?**

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Venclyxto®.
- Nei due giorni che precedono la terapia con Venclyxto® e per tutta la prima fase di essa (ca. cinque settimane) è molto importante bere almeno 1.5-2 litri d'acqua al giorno questo aiuterà il corpo a espellere le cellule tumorali distrutte dal farmaco.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.