

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Edemi o gonfiore delle articolazioni

- Contatti immediatamente l'équipe curante.

Disturbi durante la minzione

- Contatti l'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Informi il Suo medico se ritiene necessario assumere farmaci contro le vampate di calore (inclusi quelli non soggetti a prescrizione medica). Tali prodotti possono ridurre l'efficacia del farmaco.

Come si conserva Abiraterone Sandoz®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Abiraterone Sandoz®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Abiraterone Sandoz®?

- Assuma tutte le compresse della dose giornaliera prescritta in una sola volta, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo un pasto leggero.
- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Non divida o trituri le compresse da 500 mg, ma le deglutisca intere, senza masticarle. Solo le compresse da 1000 mg possono essere divise.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma dosi supplementari per compensare la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.