

Kontaktpersonen

Ärztin/Arzt

Pflegefachperson

Apotheke

Notfall

Notizen

Dieses von Fachleuten zusammengestellte Merkblatt soll den Betroffenen und ihren Angehörigen den Umgang mit dem Medikament erleichtern. Es ist eine Ergänzung zur Packungsbeilage und Fachinformation.

Version: Januar 2023
Referenz: www.swissmedicinfo.ch (2023)

©Verein Orale Tumorthérapie www.oraletumorthérapie.ch

Unterstützt durch



Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Terapie Orali in Oncologia
.ch

Merkblatt für Patientinnen und Patienten

Abiraterone Sandoz®

Abiraterone Sandoz® wurde von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt für Sie ausgewählt. Sie können die Therapie positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.

Wie sieht Abiraterone Sandoz® aus?



Abiraterone Sandoz® Tabletten zu 500 mg und 1000 mg.
Tabletten zu 500 mg: Braun-rote, ovale Tablette mit «500» auf der einen Seite gekennzeichnet.
Tabletten zu 1000 mg: Weisse, ovale Tablette ohne Prägung, jedoch mit einer Bruchrille.

Wie muss Abiraterone Sandoz® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

Wie ist die Dosierung von Abiraterone Sandoz®?

Nehmen Sie die Tabletten/Kapseln in der Dosierung gemäss Verordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes ein.

Wie nehme ich Abiraterone Sandoz® ein?

- Sie müssen alle Tabletten der verordneten Tagesdosis auf einmal einnehmen und zwar mindestens 1 Stunde vor oder 2 Stunden nach einer leichten Mahlzeit.
- Nehmen Sie die Tabletten einmal täglich, möglichst zur gleichen Zeit mit einem Glas Wasser ein.
- Schlucken Sie die 500 mg Tabletten ganz. Die Tabletten weder kauen, noch brechen oder mörsern. Nur die 1000 mg Tabletten dürfen geteilt werden.

Was mache ich, wenn ich ...

... das Medikament vergessen habe?

- Die ausgelassene Dosis nicht nachträglich einnehmen. Die nächste Einnahme erfolgt zur gewohnten Tageszeit am darauf folgenden Tag.
- Nehmen Sie nie zwei Tagesdosen am gleichen Tag ein.
- Notieren Sie sich das Datum.

... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine neuen Tabletten ein.
- Setzen Sie die Therapie am nächsten Tag unverändert fort.

... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam, damit die nächste Dosis festgelegt werden kann.

Welche Nebenwirkungen sind häufig?

Was kann ich dagegen tun?

Ödeme oder anschwellen der Gelenke

- Kontaktieren Sie unverzüglich Ihr Behandlungsteam.

Beschwerden beim Wasserlassen

- Kontaktieren Sie ihr Behandlungsteam.

In Kombination mit anderen Medikamenten könnten weitere Nebenwirkungen auftreten.

Wann muss ich mein Behandlungsteam informieren?

- Wenn Sie unter Atemnot und/oder Herzklopfen leiden.
- Wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt muss wissen, welche Medikamente oder Präparate (auch pflanzliche) Sie einnehmen.

Bringen Sie beim nächsten Arztbesuch eine Liste mit.

Was muss ich sonst noch wissen?

- Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.
- Medikamente (auch freiverkäufliche) gegen Wallungen nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt einnehmen. Diese Produkte können die Wirkung des Medikamentes stören.