

## Personnes de contact

Médecins

Infirmières et infirmiers

Pharmacie

Urgences

## Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: November 2024  
Référence : [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch) (2024)

© L'association Anticancéreux par voie orale ([www.AntiCancereuxOraux.ch](http://www.AntiCancereuxOraux.ch))

Soutenue par



Orale Tumor Therapie  
Anti Cancereux Oraux  
Terapie Orali in Oncologia  
.ch

## Information pour les patientes et les patients

### Akeega® (Niraparib/Abirateronacetat)

Vous commencez un traitement avec Akeega® et pouvez l'influencer positivement si vous observez les informations suivantes.

#### Comment se présente Akeega®?



Akeega® (Niraparib/Abirateronacetat) comprimés pelliculés 50/500 mg et 100/500 mg.  
Comprimés pelliculés à 50mg de Niraparib et 500mg d'acétate d'abiratéron : comprimés jaunes, ovales, gravés « N 50 A » sur une face.  
Comprimés pelliculés à 100mg de Niraparib et 500mg d'acétate d'abiratéron : comprimés orange, ovales, gravés « N 100 A » sur une face.

## Comment conserver Akeega® ?

Conserver le médicament à température ambiante (pas au-dessus de 30°C).

## À quelle dose Akeega® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

## Comment dois-je prendre Akeega® ?

- Prenez les comprimés pelliculés en une prise par jour, si possible à la même heure, avec un verre d'eau.
- Prenez les comprimés à jeun au moins 1 heure avant ou au moins 2 heures après le repas.
- Avalez les comprimés pelliculés entiers, ne pas les diviser, ni les mâcher, ni les écraser.

## Qu'est-ce que je fais si...

### ...j'ai oublié le médicament ?

- Prenez la dose oubliée d'Akeega® dès que possible le jour même.
- Prenez la dose suivante sans changement à l'heure prévue le lendemain.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

### ...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés pelliculés.
- Prenez la dose suivante le lendemain sans changement à l'heure prévue.

### ...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe de traitement pour fixer la prochaine prise.

## Quels sont les effets indésirables fréquents ?

### Que puis-je faire ?

#### Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.
- Signalez impérativement ces symptômes à l'équipe de traitement lors de votre prochain rendez-vous.

## Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre pour y remédier.
- S'il n'y a pas d'amélioration dans les 24 heures, contactez votre équipe de traitement.

## Constipation

- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).
- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de traitement de vous prescrire un laxatif approprié.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets indésirables peuvent apparaître.

## Quand dois-je informer mon équipe de traitement ?

- En cas d'apparition de saignements, par ex. nez, gencives, de petits points rouges ou de bleus.
- Si vous souffrez de difficultés respiratoires et/ou de palpitations.
- Si vous remarquez des signes d'infection comme de la fièvre (>38°C), des frissons, une irritation de la gorge ou une toux et un rhume.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

## Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

## Que dois-je encore savoir ?

- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.