

Information pour les patients

Alecensa® (Alectinib)

Alecensa® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Alecensa®?

Votre emballage



Emballage d'origine (Contient 4 paquets)



Alecensa® Capsules à 150 mg

Capsules à 150 mg : de couleur blanche dont la moitié supérieure est marquée ALE et la moitié inférieure 150 mg.

Comment conserver Alecensa®?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Alecensa® doit-il être utilisé?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Alecensa®?

- Prenez les capsules matin et soir lors d'un repas avec un verre d'eau.
- Avalez les capsules entières. Ne pas mâcher les capsules, ni les casser, ni les ouvrir, ni les dissoudre ou les écrasser.

Qu'est-ce que je fais si ...

...j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose oubliée, sauf s'il reste moins de 6 heures avant la prochaine dose prévue.
- Notez la date de la dose oubliée.

...j'ai vomi le médicament?

- Ne reprenez pas de gélules après les vomissements.
- Poursuivez la thérapie le lendemain à l'heure habituelle.

...j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) dès l'apparition des diarrhées selon prescription médicale.
- Pour une diarrhée légère, essayez d'ajuster votre alimentation avec du riz, des bananes et du pain blanc.
- Soyez attentif à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Nausées/vomissements

- Prenez les médicaments antinauséeux prescrits le plus tôt possible.

Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe soignante un laxatif approprié.

Douleurs musculaires

- Les analgésiques en vente libre sont autorisés.
- Signalez impérativement ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Altérations cutanées

- Procédez aux soins de la peau conformément aux instructions de l'équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté au préalable votre équipe soignante.

Œdèmes

- Contactez votre équipe soignante.

Troubles visuels

- Signaler ce symptôme à l'équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous souffrez de gonflement des jambes, d'essoufflement, de toux.
- Si vous souffrez de difficultés respiratoires importantes, de palpitations ou d'un pouls faible et de vertiges.
- Si vous présentez des signes d'infections tels que fièvre, frissons, maux de gorge ou une toux ou un rhume.
- En cas de douleurs intense, de tension ou de faiblesse musculaire.
- En cas de jaunissement de la peau et des yeux, d'urine foncée, de selles claires, de fatigue et de perte d'appétit.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles peu clairs.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- **Protection solaire:** évitez les baignades prolongées pendant et jusqu'à 7 jours après la fin du traitement. Protégez-vous des coups de soleil avec des crèmes de haute protection (facteur de protection SPF ≥ 50).
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: octobre 2020
Référence : www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse