

Informazioni riassuntive per il paziente

Alecensa® (Alectinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Alecensa®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Alecensa®?

Confezione in Suo possesso



Confezione originale (contenente 4 confezioni singole)



Alecensa® è disponibile in capsule rigide contenenti 150 mg di principio attivo, è bianca, con le diciture «ALE» e «150 mg» contrassegnate in inchiostro nero rispettivamente sulla testa e sul corpo della capsula.

Come si conserva Alecensa®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Alecensa®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Alecensa®?

- Assuma la dose che Le è stata prescritta al mattino e alla sera, durante i pasti, con un bicchiere d'acqua.
- Le capsule devono essere inghiottite intere, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Se mancano più di 6 ore alla dose successiva, prenda la dose dimenticata appena se ne ricorda. Altrimenti, tralasci la dose dimenticata e prenda la dose successiva all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguia la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco al consueto orario di somministrazione successivo. - Annoti la data.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Dolori muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Alterazioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

Edemi

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

Disturbi della vista

- Prenda contatto con l'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Gonfiori alle gambe, difficoltà a respirare, tosse.
- Respiro corto, palpitazioni o pulsazioni basse e capogiri.
- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Forti dolori, debolezza o tensioni muscolari.
- Pelle di colore giallo o ingiallimento del bianco degli occhi, urine scure, feci chiare, stanchezza e inappetenza.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- **Protezione solare:** Eviti l'esposizione al sole durante l'assunzione di Alecensa® e per almeno 7 giorni dopo l'interruzione del trattamento. Previene le scottature solari utilizzando una protezione solare ad ampio spettro contro i raggi ultravioletti (fattore di protezione [SPF] ≥ 50).
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.
La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: dicembre 2020
Fonte di riferimento: www.swissmedinfo.ch