



## Informazioni riassuntive per il paziente

# Alunbrig® (Brigatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Alunbrig®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

## Che aspetto ha Alunbrig®?



Alunbrig® è disponibile in compresse da 30 mg, 90 mg e 180 mg.

Alunbrig® compresse rivestite con film da 30 mg: di colore da bianco a grigio-bianco, rotonde, con impresso «U3» su un lato.

Alunbrig® compresse rivestite con film da 90 mg: di colore da bianco a grigio-bianco, ovali, con impresso «U7» su un lato.

Alunbrig® compresse rivestite con film da 180 mg: di colore da bianco a grigio-bianco, ovali, con impresso «U13» su un lato.

## Come si conserva Alunbrig®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Alunbrig®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Alunbrig®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le compresse in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso ancora il giorno stesso.
- Non assuma dosi supplementari per compensare la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assumi un'altra dose, ma prenda la dose successiva all'ora prevista.
- Non assumi il farmaco un'altra volta.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

## Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

## Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).

## Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

## Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Disturbi della vista, p. es. vista offuscata, deterioramento della vista.
- Segni d'infezione come febbre (>38 °C), brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/ compresse al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Eventuali disturbi della sensibilità; da segnalare in occasione del prossimo consulto.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**

## Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) sono controindicati durante la terapia con Alunbrig®. Tali prodotti possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Alunbrig®.
- Alunbrig® può causare fotosensibilità, eviti quindi l'esposizione diretta e prolungata al sole (cercare l'ombra, indossare abiti lunghi e cappello).
- Alunbrig® può provocare stanchezza, può pertanto ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

## Contatti

Medico

---

Personale infermieristico

---

Farmacista

---

Pronto soccorso

---

## Appunti

---

---

---

---

---

---

---

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Agosto 2022

Fonte di riferimento: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)

© L'associazione Terapia orale dei tumori [www.terapieorallinoncologia.ch](http://www.terapieorallinoncologia.ch)

Supportato da

