



Informazioni riassuntive per il paziente

Bosulif® (Bosutinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Bosulif®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Bosulif®?



Bosulif® è disponibile in compresse rivestite con film da 100 mg e 500 mg.
Compresse da 100 mg: ovali, di colore giallo con impresso «Pfizer» su un lato e «100» sull'altro.
Compresse da 500 mg: ovali, di colore rosso con impresso «Pfizer» su un lato e «500» sull'altro.

Come si conserva Bosulif®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Bosulif®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Bosulif®?

- Assuma la dose che Le è stata prescritta durante i pasti, con un bicchiere d'acqua.
- Non divida o trituri le compresse rivestite con film, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.
- Non assuma dosi supplementari per compensare la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assumo il farmaco un'altra volta.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Mal di testa o dolori articolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C o sanguinamenti.
- Aumento di peso o difficoltà a respirare.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) sono controindicati durante la terapia con Bosulif®. Tali prodotti possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Bosulif®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: Luglio 2015

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

