



Information pour les patients

Brukinsa® (Zanubrutinib)

Brukinsa® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Brukinsa® ?



Brukinsa® : Gélules de 80 mg.
Gélules blanches marquées avec „ZANU 80“ en noir sur la moitié supérieure.

Comment conserver Brukinsa® ?

Conserver à une température ambiante.

À quelle dose Brukinsa® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Brukinsa® ?

- Prenez les gélules soit une prise par jour, soit réparties en deux prises, matin et soir.
- Prenez les gélules avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre les gélules avec ou sans nourriture.
- Avalez les gélules entières. Ne les mâchez pas, ni les ouvrez, ni les cassez et ne les écrasez pas.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Une fois par jour : La dose oubliée n'est pas prise plus tard. Continuer le traitement normalement à l'heure prévue le lendemain.
- Deux fois par jour : la dose oubliée ne sera pas prise ultérieurement. Poursuivez le traitement en prenant la dose suivante à l'heure habituelle.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas une autre dose, mais prenez la dose suivante à l'heure prévue.

...j'ai pris trop de comprimés /capsules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).

Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de traitement de vous prescrire un laxatif adapté.

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.
- Signalez impérativement ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Éruption cutanée

- Effectuez les soins de la peau selon les instructions de l'équipe de traitement.
- N'utilisez pas de produits sans en avoir discuté avec votre équipe de traitement.

Fatigue

- En cas de fatigue extrême, veuillez faire preuve de prudence lors de la conduite de véhicule ou de l'utilisation de machines dangereuses.

Vertiges

- Soyez prudent lorsque vous vous levez.
- Si les troubles persistent, contactez l'équipe de traitement.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- Si vous constatez des signes d'infection tels que fièvre > 38°C ou des frissons.
- Si vous souffrez de toux et d'essoufflement.
- En cas d'apparition de saignements, par ex. du nez, des gencives.
- Si la diarrhée persiste ou s'aggrave malgré la prise d'un dosage normal de la substance active Lopéramide (par ex. Immodium®) avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmier/ère

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : janvier 2023
Référence : www.swissmedicinfo.ch (2023)

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO