



## Come si conserva Brukinsa®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Brukinsa®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Brukinsa®?

- Assuma la dose di capsule prescritta una volta al giorno o suddivisa in due somministrazioni al mattino e alla sera.
- Assuma le capsule con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le capsule in concomitanza o meno dei pasti.
- Le capsule devono essere assunte intere, senza masticarle, aprirle, dividerle o tritarle.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Una volta al giorno: non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua la terapia come d'abitudine assumendo il farmaco all'ora prestabilita.
- Due volte al giorno: non assuma più tardi la dose dimenticata. Prosegua con la seconda dose o quella successiva all'ora prescritta.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma un'altra dose, ma prenda la dose successiva all'ora prevista.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

#### Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi all'équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

#### Dolori articolari e muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

#### Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

#### Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

#### Capogiri

- Faccia attenzione quando si alza.
- Se i sintomi persistono, contatti l'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Segni d'infezione come febbre (>38 °C), brividi.
- Tosse e difficoltà a respirare.
- Sanguinamenti p.es. dal naso o dalle gengive.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/comprese al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

## Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

## Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (iperico) sono controindicati durante la terapia con Brukinsa®. Tali prodotti possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Brukinsa®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.