

Informazioni riassuntive per il paziente

Cabometry® (Cabozantinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Cabometry®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Comment se présente Cabometry®?



Cabometry® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 20 mg, 40 mg o 60 mg di principio attivo.

La compressa da 20 mg è gialla, rotonda con la dicitura «XL» impressa su un lato e il numero «20» impresso sull'altro lato.

La compressa da 40 mg è gialla, di forma triangolare con la dicitura «XL» impressa su un lato e il numero «40» impresso sull'altro lato.

La compressa da 60 mg è gialla di forma ovale con la dicitura «XL» impressa su un lato e il numero «60» impresso sull'altro lato.

Come si conserva Cabometyx®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Cabometyx®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Cabometyx®?

- Assuma le compresse a digiuno, almeno 1 ora prima o 2 ore dopo il pasto.
- Assuma le compresse se possibile sempre alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso entro 12 ore.
- Altrimenti attenda il giorno successivo e assuma la dose giornaliera prescritta all'ora prestabilita.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.
- Annoti la data.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Eruzione cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.

Debolezza e stanchezza

- La debolezza e la stanchezza possono ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Palpitazioni, respirazione o deglutizione difficoltose o capogiri.
- Segni d'infezione come febbre, brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Pregresso aumento dell'arrossamento delle mani e dei piedi.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non assuma pompelmo o i suoi derivati, essi possono ridurre l'efficacia di Cabometyx®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

