

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo è controindicato durante la terapia con Calquence®. I prodotti elaborati con pompelmo possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Calquence®.

Contatti

Medico _____

Personale infermieristico _____

Farmacista _____

Pronto soccorso _____

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: : Luglio 2022

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancerieux Oraux
Terapie Orali in Oncologia
.ch

Informazioni riassuntive per il paziente

Calquence® (Acalabrutinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Calquence®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Calquence®?



Calquence® è disponibile in capsule da 100 mg. Capsule con parte inferiore gialla e parte superiore blu, con la scritta «ACA 100 mg» in nero.

Come si conserva Calquence®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Calquence®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Calquence®?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le capsule in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida, apra o trituri le capsule, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le capsule in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida, apra o trituri le capsule, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Capogiri

- Faccia attenzione quando si alza.
- Se i sintomi persistono, contatti l'équipe curante.

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Diarrea

- Beva almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane).
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Assuma tempestivamente un farmaco con la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle e si protegga dal sole come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

Dolori articolari e muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).
Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Tosse e difficoltà a respirare.
- Difficoltà a respirare e/o tachicardia/palpitazioni.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/compresse al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Nuove alterazioni cutanee evidenti.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.