



Informazioni riassuntive per il paziente

Calquence® (Acalabrutinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Calquence®. Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Calquence®?



Calquence® è disponibile in capsule da 100 mg. Capsule con parte inferiore gialla e parte superiore blu, con la scritta «ACA 100 mg» in nero.

Come si conserva Calquence®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Calquence®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Calquence®?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le capsule in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida, apra o trituri le capsule, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose prescritta mattina e sera (2 volte/giorno), se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le capsule in concomitanza o meno dei pasti.
- Non divida, apra o trituri le capsule, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Capogiri

- Faccia attenzione quando si alza.
- Se i sintomi persistono, contatti l'équipe curante.

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito che Le sono stati prescritti.
- Contatti il Suo medico qualora la nausea e/o il vomito perdurassero oltre 24 ore.

Diarrea

- Beva almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane).
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Assuma tempestivamente un farmaco con la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle e si protegga dal sole come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

Dolori articolari e muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo).
Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Stanchezza

- In caso di sonnolenza pronunciata, è richiesta cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari pericolosi.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre i 38 °C.
- Tosse e difficoltà a respirare.
- Difficoltà a respirare e/o tachicardia/palpitazioni.
- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule/ compresse al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Nuove alterazioni cutanee evidenti.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo è controindicato durante la terapia con Calquence®.
I prodotti elaborati con pompelmo possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Calquence®.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: : Luglio 2022

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapiorallinoncologia.ch

Supportato da

