

Informazioni riassuntive per il paziente

Caprelsa® (Vandetanib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Caprelsa®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Caprelsa®?



Caprelsa® è disponibile in compresse rivestite con film contenenti 100 mg o 300 mg di principio attivo.

La compressa da 100 mg è rotonda e di colore bianco con impresso "Z100" su un lato.

La compressa da 300 mg è ovale e di colore bianco con impresso "Z300" su un lato.

Comprimés pelliculés à 100 mg : blancs de forme ronde, marqués « Z100 » d'un côté.

Come si conserva Caprelsa®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Caprelsa®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Caprelsa®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Indipendentemente dal pasto.
- Non divida, o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.
- In caso di difficoltà a deglutire: può immergere la compressa intera in mezzo bicchiere di acqua naturale (non deve essere utilizzato alcun altro liquido). Mescolare di tanto in tanto fino alla sua dispersione (ca.10 minuti), la dispersione ottenuta deve essere assunta immediatamente. Eventuali residui rimasti nel bicchiere devono essere mescolati con altra acqua e assunti.

Che cosa faccio se...

...ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
- Assuma la dose dimenticata almeno 12 ore prima dell'orario di somministrazione successivo. Altrimenti, tralasci la dose dimenticata e prenda la dose successiva all'ora prestabilita.
- Non assuma una dose doppia per compensare la dimenticanza nella stesso giorno.

...ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.
- Annoti la data.

...ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Alterazioni della cute (eruzione, arrossamento).
- Difficoltà a respirare e/o palpitazioni oppure capogiri eventualmente accompagnati da febbre e tosse.
- Gonfiori alle gambe, respiro corto.
- Mal di testa, disturbi della vista o confusione.
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Durante la terapia con Caprelsa®, indossi indumenti che proteggono contro il sole e applichi una crema solare con un alto fattore di protezione sulle parti del corpo scoperte.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.
La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: dicembre2020
Fonte di riferimento: www.swissmedinfo.ch