



## Come si conserva Casodex®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Casodex®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Casodex®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile sempre alla stessa ora.
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.
- Può assumere le compresse indipendentemente dai pasti.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- NON recuperi la dose dimenticata e continui con la dose successiva alla solita ora.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta, attenda il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverta immediatamente la Sua équipe curante.

## Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

### Che cosa posso fare per contrastarli?

#### Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

#### Vampate di calore e/o sudorazione aumentata

- Di norma, le vampate di calore diminuiscono nel corso della terapia.
- Si rivolga alla Sua équipe curante per suggerimenti su possibili adeguamenti dello stile di vita atti a lenire tali disturbi.

## Sensibilità dei capezzoli e sensazione di tensione al petto

- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

## Edemi

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

## Nausea/vomito

- Assuma per tempo i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Alterazioni della pelle (eruzioni cutanee, arrossamenti)
- Edemi (gonfiori) alle gambe
- Affanno respiratorio e/o palpitazioni eventualmente accompagnati da tosse e febbre
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

## Il Suo medico deve sapere quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

## Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Non assuma farmaci contro le vampate di calore: possono ridurre l'efficacia di Casodex®. Ciò vale anche per i farmaci non soggetti a prescrizione medica.
- A causa di effetti collaterali come vertigini e sonnolenza, Casodex® può ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.