



Informazioni riassuntive per il paziente

Casodex®

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Casodex[®]. Le seguenti informazioni Le consentiranno di ottenere effetti ottimali dalla terapia.

Che aspetto ha Casodex®?



Casodex® è disponibile in compresse contenenti 50 mg o 150 mg di principio attivo.

Le compresse da 50 mg sono rotonde e di colore bianco. Su un lato riportano il cerchio con la freccia, simbolo del genere maschile, e sull'altro la scritta «Cdx50».

Le compresse da 150 mg sono ovali e di colore bianco. Su un lato riportano il cerchio con la freccia, simbolo del genere maschile, e sull'altro la scritta «Cdx150».

Come si conserva Casodex®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Casodex®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Casodex®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile sempre alla stessa ora.
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.
- Può assumere le compresse indipendentemente dai pasti.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- NON recuperi la dose dimenticata e continui con la dose successiva alla solita ora.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

 Non assuma il farmaco un'altra volta, attenda il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

• Avverta immediatamente la sua équipe curante .

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere almeno 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Vampate di calore e/o sudorazione aumentata

- Di norma, le vampate di calore diminuiscono nel corso della terapia.
- Si rivolga alla Sua équipe curante per suggerimenti su possibili adeguamenti dello stile di vita atti a lenire tali disturbi.

Sensibilità dei capezzoli e sensazione di tensione al petto

• Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

Edemi

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

Nausea/vomito

 Assuma per tempo i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Alterazioni della pelle (eruzioni cutanee, arrossamenti)
- Edemi (gonfiori) alle gambe
- Affanno respiratorio e/o palpitazioni eventualmente accompagnati da tosse e febbre
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

Il Suo medico deve sapere quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Non assuma farmaci contro le vampate di calore: possono ridurre l'efficacia di Casodex[®]. Ciò vale anche per i farmaci non soggetti a prescrizione medica.
- A causa di effetti collaterali come vertigini e sonnolenza, Casodex® può ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

Contatti

Medico
Personale infermieristico
Farmacista
Pronto soccorso
Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.