

Information pour les patients

Erivedge® (Vismodegib)

Erivedge® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Erivedge®?



Erivedge® capsules à 150 mg: Capsules marqués sur le côté rose avec «150» et sur le côté vert avec «VISMO».

Comment conserver Erivedge®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Erivedge® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Erivedge®?

- Prenez les capsules une fois par jour, avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les capsules avec ou sans nourriture.
- Avalez les capsules en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose manquée par la suite le même jour.
- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Notez cette date.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire ?

Crampes musculaires

- Mobilisez-vous régulièrement sans faire de gros efforts et appliquez des enveloppements chauds et secs. Signalez les problèmes persistants à votre équipe soignante.

Altération du goût

- Discutez des altérations du goût prononcées avec votre équipe soignante. Des conseils nutritionnels peuvent être utiles.

Nausées, vomissements

- Prenez le médicament prescrit sans attendre.

Saignements (nez, gencives)

- Contactez votre équipe soignante.

Perte d'appétit et de poids

- Mangez souvent, par petites portions, établissez un plan d'alimentation, prenez une collation avant d'aller au lit, mangez des aliments riches en protéines.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Chute des cheveux

- Faites-vous conseiller par votre équipe soignante pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

Fatigue

- Prévoyez suffisamment de sommeil et de repos, planifiez des moments de sieste ou de pause.

Constipation

- Si les symptômes persistent, consultez votre équipe soignante pour un laxatif approprié.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Les patients sont souvent fatigués sous Erivedge®, l'aptitude à conduire ou faire fonctionner des machines dangereuses peut être limitée.
- Le cycle menstruel est souvent conservé pendant le traitement avec Erivedge®.
- En raison du risque de malformations congénitales chez les enfants à naître, les femmes doivent nécessairement maintenir une contraception rigoureuse sous traitement de Erivedge® et jusqu'à 24 mois après le traitement.
- Les hommes devraient utiliser des préservatifs pendant le traitement et les 2 mois suivant l'utilisation de Erivedge®.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 201

Référence: www.swissmedinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse