

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- I pazienti che assumano Erleada® soffrono spesso di stanchezza, ciò può pertanto ridurre l'idoneità alla guida e la capacità di azionare macchine o attrezzi pericolosi.

Contatti

Medico _____

Personale infermieristico _____

Farmacista _____

Pronto soccorso _____

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: ottobre 2024

Fonte di riferimento: www.swissmedinfo.ch

© L'associazione Terapia orale dei tumori www.terapieorallinoncologia.ch

Supportato da

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologique Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancerux Oraux
Thérapie Orali in Oncologia
.ch

Informazioni riassuntive per il paziente

Erleada® (Apalutamid)

Sta per iniziare una terapia con Erleada® potrà ottenere maggiori benefici se terrà conto delle seguenti raccomandazioni.

Che aspetto ha Erleada®?



Erleada® è disponibile in compresse rivestite con film da 240mg.
Compresa da 240mg: da grigio-blu a grigio, ovale, con impresso «E240» su un lato.

Come si conserva Erleada®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente (non oltre i 30°C).

Come si dosa Erleada®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Erleada®?

- Assuma la dose giornaliera prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile, sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Può assumere le compresse durante o fuori dai pasti.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.
- In caso di difficoltà a deglutire:
 - Mettere la compressa in una tazza senza schiacciarla.
 - Aggiungere 2 cucchiaini da tè (10ml) d'acqua non gassata; la compressa deve essere completamente coperta dall'acqua. Attendere 2 minuti finché la compressa non si è dissolta, quindi mescolare la miscela.
 - Aggiungere 2 cucchiaini di una delle seguenti bevande non gassate o cibi morbidi e mescolare: succo d'arancia, tè verde, purea di mele o yogurt da bere.
 - Assumere immediatamente la miscela, quindi sciacquare due volte la tazza con acqua e bere questo liquido.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso ancora il giorno stesso.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, all'ora prestabilita.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Inappetenza/perdita di peso

- Può essere utile consumare tanti piccoli pasti ripartiti sull'arco della giornata preferendo cibi di cui si ha voglia al momento.
- In caso d'inappetenza persistente, contatti la Sua équipe curante.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).
- Contatti l'équipe curante qualora la diarrea perdurasse oltre 24 ore.
- Contatti immediatamente l'équipe curante in caso di oltre 7 defecazioni ravvicinate nell'arco di 24 ore.

Dolori articolari

- Sono consentiti gli antidolorifici di uso corrente, non soggetti a prescrizione medica (p. es. paracetamolo). In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non usi prodotti per la cura della pelle senza prima aver consultato l'équipe curante.

Vampate di calore

- Di norma, le vampate di calore diminuiscono nel corso della terapia.
- Si rivolga alla Sua équipe curante per suggerimenti su possibili adeguamenti dello stile di vita atti a lenire tali disturbi.

Rischio di cadute

- Faccia attenzione quando si alza.
- In caso di disturbi contatti l'équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Alterazioni cutanee (eruzioni, arrossamenti per es. ai palmi delle mani e dei piedi).
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

- Possono verificarsi interazioni con altri medicinali e preparati (compresi quelli a base di erbe).