

Que dois-je encore savoir ?

- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du médicament. Par conséquent, veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin _____

Infirmière / infirmier _____

Pharmacie _____

Urgences _____

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version : août 2022
Référence : www.swissmedicinfo.ch (2022)

© L'association Anticancéreux par voie orale www.anticancereuxoraux.ch

Soutenu par

 Onkologiepflege Schweiz
Soins en Oncologie Suisse
Cure Oncologica Svizzera

 SSMO
SSOM
SGMO



Orale Tumor Therapie
Anti Cancereux Oraux
Therapie Orali in Oncologia
.ch

Information pour les patients

Gavreto® (Pralsetinib)

Gavreto® a été choisi pour vous par votre médecin.
Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Gavreto® ?



Gavreto® : Gélules à 100mg.

Gélules : bleu clair, marquées « 100 mg » sur la partie supérieure et « BLU-667 » sur la partie inférieure.

Comment conserver Gavreto® ?

Conserver le médicament à température ambiante.

À quelle dose Gavreto® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Gavreto® ?

- Prenez les gélules en une prise par jour, si possible à la même heure avec un verre d'eau.
- Prenez toutes les gélules de la dose quotidienne en une seule fois, à jeun soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas.
- Avalez les gélules entières sans les mâcher, ni les ouvrir ou les écraser.

Qu'est-ce que je fais si...

...j'ai oublié le médicament ?

- Vous pouvez encore prendre les gélules le jour même. Prenez votre prochaine dose le lendemain à l'heure prévue.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Notez la date de l'oubli.

...j'ai vomi le médicament ?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés.
- Poursuivez le traitement sans le modifier le lendemain.

...j'ai pris trop de comprimés ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Veillez à boire au moins 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé).
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.
- Signalez impérativement ces symptômes à votre médecin lors de votre prochain rendez-vous.

Mal de tête

- Les antidouleurs habituels en vente libre (p. ex. paracétamol) sont autorisés.

Fatigue

- En cas de fatigue importante, veuillez faire preuve de prudence lors de la conduite de véhicule ou de l'utilisation de machines dangereuses.

Œdèmes

(gonflements dus à la rétention de liquide corporel - souvent autour des yeux et des chevilles et prise de poids rapide)

- Demandez à votre médecin quels médicaments vous pouvez prendre pour ces troubles.

Constipation

- Si les symptômes persistent, demandez à votre équipe de traitement de vous prescrire un laxatif approprié.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe traitement ?

- Si vous remarquez des signes d'infection tels que fièvre supérieure à 38°C, des frissons, une irritation de la gorge ou une toux et un rhume.
- Si vous présentez des symptômes tels que la confusion ou des vertiges.
- Si vous présentez des symptômes tels qu'une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, ainsi qu'une urine foncée.
- Si la diarrhée ne peut être arrêtée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- En cas d'apparition de problèmes de cicatrisation, de saignements (p.ex. nez, gencives). ou des hématomes.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexpliqués.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.