

Informazioni riassuntive per il paziente

Giotrif® (Afatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Giotrif®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Giotrif®?



Giotrif® è disponibile in compresse rivestite con film da 20mg, 30 mg, 40 mg e 50mg:
La compressa da 20 mg è giallognola, rotonda, con il codice “T20” impresso su un lato e il logo di Boehringer Ingelheim sull’altro.

La compressa da 30 mg è blu scuro, rotonda, con il codice “T30” impresso su un lato e il logo di Boehringer Ingelheim sull’altro.

La compressa da 40 mg è blu chiaro, rotonda con il codice “T40” impresso su un lato ed il logo di Boehringer Ingelheim sull’altro.

La compressa da 50 mg è blu scuro, ovale, con il codice “T50” impresso su un lato e il logo di Boehringer Ingelheim sull’altro.

Come si conserva Giotrif®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Giotrif®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Giotrif®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Prenda il farmaco a digiuno almeno 1 ora prima o 3 ore dopo il pasto.
- Non divida o trituri le compresse, ma le deglutisca intere senza masticarle
- In caso di difficoltà a deglutire: immerga la compressa senza frantumarla in acqua non gasata, mescoli fino allo scioglimento e beva subito il liquido. Riempia nuovamente il bicchiere con l'acqua e la beva per essere certo di aver assunto tutto il medicinale.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Se la dose successiva è prevista dopo più di 8 ore, prenda la dose dimenticata non appena se ne ricorda.
- Se la dose successiva è prevista entro 8 ore, salti la dose dimenticata e prenda quella successiva al solito orario. Quindi prosegua ad assumere le compresse agli orari regolari come al solito.
- Non prenda una dose doppia (due compresse invece di una alla stessa ora) per compensare la dimenticanza della dose.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata dopo ogni pasto e, se possibile, anche tra i pasti (½-1 cucchiaino da tè di sale per 1 litro di acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione delle mucose orali non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

Eruzioni cutanee/acne

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

Sensibilità alla luce e scottature solari

- La pelle è molto sensibile alla luce solare durante questo periodo.
- Eviti l'esposizione al sole, indossi indumenti che la proteggono e quando possibile cerchi di stare all'ombra.
- Applichi una protezione solare ad ampio spettro contro i raggi ultravioletti (fattore di protezione [SPF] ≥ 50).

Infiammazione del letto ungueale

- Contatti la sua équipe curante.

Sanguinamento dal naso

- Contatti la sua équipe curante.

Irritazione o infiammazione oculare

- Contatti la sua équipe curante se sviluppa lacrimazione/secchezza, infiammazione, sensibilità alla luce, vista offuscata o dolore agli occhi.
- Indossi degli occhiali da sole quando si espone alla luce naturale del sole.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium).
- Difficoltà a respirare, eventualmente accompagnata da febbre e tosse.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- L'erba di San Giovanni (o iperico) può interferire sull'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tale sostanza durante la terapia con Giotrif®.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: settembre 2021

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera