

## Che cos'altro devo sapere?

- Non assuma prodotti che contengono il principio attivo paracetamolo (per es. Pandol<sup>®</sup>, Dafalgan<sup>®</sup>, Actalgin<sup>®</sup>, NeoCitran<sup>®</sup>, Pretuval<sup>®</sup>) durante la terapia con Glivec<sup>®</sup>.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia di Glivec<sup>®</sup>. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

## Contatti

Medico

---

Personale infermieristico

---

Farmacista

---

Pronto soccorso

---

## Appunti

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: luglio 2021

Fonte di riferimento: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch)

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera

## Informazioni riassuntive per il paziente

# Glivec® (Imatinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Glivec®.  
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

## Che aspetto ha Glivec®?



Glivec® è disponibile in compresse rivestite con film da 100 mg e da 400 mg. La compressa da 100 mg è di colore marrone-arancio, rotonda con linea di frattura e con la dicitura «NVR» impressa su un lato e «SA» sull'altro lato. La compressa può essere divisa in due dosi.

La compressa da 400 mg è di colore marrone-arancio, ovale con la dicitura «NVR» impressa su un lato e «SL» sull'altro lato.

## Come si conserva Glivec®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

## Come si dosa Glivec®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

## Come si somministra Glivec®?

- Fino a 600 mg della dose giornaliera prescritta: Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora, durante un pasto, con un bicchiere d'acqua.
- Può dividere le compresse.
- In caso di difficoltà a deglutire: sciogliere le compresse in acqua non gasata o succo di mela (compressa da 100 mg in 50 ml, compressa da 400 mg in 200 ml) e dopo completa dissoluzione assumere la sospensione immediatamente.
- Per dosaggi superiori a 600 mg al giorno, si applicano raccomandazioni speciali.

## Che cosa faccio se ...

### ... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma il prima possibile nello stesso giorno la sua normale dose.
- Non assuma mai il doppio della dose giornaliera prescritta nello stesso giorno.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

### ... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

### ... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

## **Quali sono gli effetti collaterali più frequenti? Che cosa posso fare per contrastarli?**

### **Edemi**

- Gli edemi sono dei gonfiori, dovuti a ritenzione di liquidi, che possono formarsi agli arti inferiori (caviglie, piedi e gambe), ma anche alle mani e al viso, con conseguente repentino aumento di peso.
- Avvisi tempestivamente l'équipe curante.

### **Mal di testa**

- Chieda al suo medico quali farmaci assumere contro questo disturbo. Non assuma farmaci che contengono il principio attivo paracetamolo.

### **Eruzioni cutanee, rossore cutaneo**

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

### **Nausea/vomito/inappetenza**

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.

### **Diarrea**

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

## **Che cosa devo segnalare all'équipe curante?**

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®).
- Febbre oltre 38°C.
- Alterazioni cutanee (eruzioni, arrossamento, prurito).
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

**Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.**