

Information pour les patients

Hycamtin® (Topotecan)

Hycamtin® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Hycamtin®?



Hycamtin® capsules à 0,25 mg et 1 mg.

Capsules à 0,25 mg: Capsules blanc cassé à blanc-jaunâtre, marquées avec «HYCAMTIN» et «0.25mg».

Capsules à 1 mg: Capsules roses, marquées avec «HYCAMTIN» et «1 mg».

Comment conserver Hycamtin®?

Entreposez le médicament au frigo.

A quelle dose Hycamtin® doit être utilisé?

Prenez les capsules à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Hycamtin®?

- Prenez les capsules en une prise par jour avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Hycamtin® est généralement pris pendant 5 jours consécutifs.
- Vous pouvez prendre les capsules avec ou sans nourriture.
- Avalez les capsules en entier. Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les capsules.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Prenez la dose manquée par la suite le même jour.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouvelles capsules le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de capsules?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Nausées, vomissements

- Prenez le médicament prescrit sans attendre.

Chute de cheveux

- Faites-vous conseiller par votre équipe soignante pour une perruque ou d'autres moyens adaptés.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (par ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Juillet 2015

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse