

Personnes de contact

Médecin _____

Infirmières _____

Pharmacie _____

Urgences _____

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Information pour les patients

Ibrance® (Palbociclib)

Ibrance® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Ibrance® ?



Ibrance® : Gélules de gélatine dure de 75 mg, 100 mg et 125 mg.

Ibrance® 75 mg est une gélule en gélatine dure orange clair, marquée « Pfizer » et « PBC 75 » en blanc.

Ibrance® 100 mg est une gélule en gélatine dure de couleur orange clair et caramel, marquée « Pfizer » et « PBC 100 » en blanc.

Ibrance® 125 mg est une gélule en gélatine dure de couleur caramel, marquée « Pfizer » et « PBC 125 » en blanc.

Comment conserver Ibrance® ?

Conserver à température ambiante.

À quelle dose Ibrance® doit-il être utilisé ?

Selon la prescription de votre médecin.

Comment dois-je prendre Ibrance® ?

- Avalez la gélule avec un verre d'eau lors d'un repas si possible, à la même heure chaque jour pendant 21 jours, suivi d'une pause de 7 jours.
- Avalez la gélule entière.
- Ne pas mâcher, ni casser, ni ouvrir ou écraser la gélule.

Qu'est-ce que je fais si ...

... dj'ai oublié le médicament ?

- Ne prenez pas la dose oubliée plus tard.
- Prenez la dose suivante le lendemain à l'heure habituelle de la journée.
- Ne prenez jamais deux doses quotidiennes le même jour.
- Prenez note de la date de l'oubli.

... j'ai vomi le médicament ?

- Ne reprenez pas de nouvelles gélules.
- Poursuivez le traitement sans changement le jour suivant.

... j'ai pris trop de gélules ?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire ?

Diarrhées

- Veillez à boire en quantité suffisante environ 2 litres par jour (p. ex. de l'eau, du thé ou du bouillon).
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Prenez du loperamide (p. ex. Imodium®) suffisamment tôt dès l'apparition des diarrhées.

Mal de tête

- Les antidouleurs habituels en vente libre (par exemple, le paracétamol) sont autorisés.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Plusieurs fois par jour, au moins après chaque repas, se rincer la bouche avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2 - 1 cuillère à café/litre d'eau).
- S'il n'y a pas d'amélioration et que l'apport de liquides et d'aliments est diminué et rendu difficile, contactez l'équipe de soins.

Nausées/ vomissements

- Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements sans attendre.

Perte d'appétit

- Il peut être bénéfique de consommer plusieurs petites portions par jour et de manger les aliments que vous appréciez et qui vous font envie.
- En cas d'anorexie prolongée, prenez contact avec votre équipe de soins.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante ?

- En cas de saignement, par exemple : nez, gencives.
- Si vous avez de la fièvre supérieure à 38°C, des frissons.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou d'autres troubles inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez.

Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir ?

- Vous ne devez pas prendre de préparations à base de pamplemousse ou de millepertuis pendant le traitement. Ces produits peuvent interférer avec l'efficacité du médicament. Veillez à ne pas consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.