

Informazioni riassuntive per il paziente

Imnovid® (Pomalidomid)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Innovid®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Innovid®?



Imnovid® è disponibile in capsule rigide da 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg:
Imnovid® capsula rigida da 1 mg con testa blu scuro opaco e corpo giallo opaco, recante la scritta "POML" con inchiostro bianco e "1 mg" con inchiostro nero.
Imnovid® capsula rigida da 2 mg con testa blu scuro opaco e corpo arancione opaco, recante la scritta "POML 2 mg" con inchiostro bianco.
Imnovid® capsula rigida da 3 mg con testa blu scuro opaco e corpo verde opaco, recante la scritta "POML 3 mg" con inchiostro bianco.
Imnovid® capsula rigida da 4 mg capsule rigide con testa blu scuro opaco e corpo blu chiaro opaco, recante la scritta "POML 4 mg" con inchiostro bianco.

Come si conserva Imnovid®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Imnovid®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Imnovid®?

- Assuma la dose prescritta ogni giorno all'incirca alla stessa ora con un bicchiere d'acqua.
- Le capsule possono essere assunte con o senza cibo.
- Deglutisca le capsule intere con acqua, non devono essere aperte, sciolte, spezzate o masticate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Assuma la dose dimenticata il più presto possibile, ma in ogni caso lo stesso giorno.
- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Prosegua la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Nausea/vomito/inappetenza

- Assumi tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.

Dolori muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.

Capogiri (vertigini)

- Faccia attenzione al mattino, non si alzi di scatto, rimanga seduto un momento sul bordo del letto.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Febbre oltre 38°C o sanguinamenti.
- Brividi, infiammazione della gola o tosse e raffreddore.
- Difficoltà a respirare, dolori al torace e/o palpitazioni.
- Gonfiore alle gambe.
- In caso di affaticamento grave e crescente.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.

Che cos'altro devo sapere?

- Imnovid® può determinare malformazioni del nascituro.
- Le donne in età fertile devono pertanto adottare un metodo anticoncezionale altamente efficace per tutta la durata della terapia con Imnovid® e nel mese successivo per evitare una gravidanza.
- Gli uomini devono usare profilattici per tutta la durata del trattamento e per 7 giorni dopo la fine della terapia con Imnovid®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.