

Information pour les patients

Inlyta® (Axitinib)

Inlyta® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Inlyta®?



Inlyta® comprimés filmés à 1 mg et 5 mg:

Comprimés filmés à 1 mg: Comprimés filmés rouges, ovales, marqués sur un côté avec «Pfizer» et sur l'autre avec «1 XNB».

Comprimés filmés à 5 mg: Comprimés filmés rouges, triangulaires, marqués sur un côté avec «Pfizer» et sur l'autre avec «5 XNB».

Comment conserver Inlyta®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Inlyta® doit être utilisé?

Prenez les comprimés filmés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Inlyta®?

- Prenez les comprimés filmés avec un verre d'eau, matin et soir, de préférence toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les comprimés filmés avec ou sans nourriture.

Qu'est-ce que je fais si...

... j'ai oublié le médicament?

- Ne prenez pas la dose manquée par la suite le même jour.
- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle du jour suivant.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés filmés le même jour.
- La dose prochaine est prise à l'heure fixée le même soir ou le lendemain matin.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante sans attendre.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Douleurs articulaires et musculaires

- Les antidouleurs en vente libre sont autorisés (p.ex. Paracétamol).
- Lors de votre prochaine consultation, il est impératif de signaler ces symptômes à votre médecin.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.
- Si aucune amélioration dans les 24 heures, contactez votre médecin.

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Constipation

- Si les symptômes persistent, consultez votre équipe soignante pour un laxatif approprié.

Maux de tête

- Les antidouleurs en vente libre sont autorisés (p.ex. Paracétamol).
- Si les symptômes persistent, consultez votre équipe soignante pour d'autres mesures appropriées.

Eruptions cutanées, rougeurs

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.

Modification de la voix

- Souvent associée à la prise d'Inlyta®, elle est généralement inoffensive.

Fatigue et troubles de la concentration

- En cas de troubles importants de la concentration, faites preuve de prudence en cas de conduite d'un véhicule.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas d'essoufflement, gonflement des jambes ou de fortes céphalées.
- En cas de saignements.
- Faites contrôler votre tension artérielle au moins une fois par semaine.
- En cas de valeurs supérieures à 145/85, contactez votre médecin.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse ou de millepertuis. Ces produits peuvent interférer avec l'effet de l'Inlyta®. Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013

Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse