

Che cos'altro devo sapere?

- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia del farmaco. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia con Inlyta®.
- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.

Contatti

Medico

Personale infermieristico

Farmacista

Pronto soccorso

Appunti

Con queste informazioni sintetiche, l'équipe curante intende facilitare la somministrazione della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti.

La presente scheda informativa vuole essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti.

Versione: settembre 2021

Fonte di riferimento: www.swissmedicinfo.ch

©Società svizzera di oncologia medica/Cure Oncologiche Svizzera

Informazioni riassuntive per il paziente

Inlyta® (Axitinib)

Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Inlyta®.
Le seguenti informazioni Le consentiranno di aderire in modo ottimale alla terapia.

Che aspetto ha Inlyta®?



Inlyta® è disponibile in compresse rivestite da film da 1 mg, 3mg, 5 mg e da 7 mg:
Compressa rivestita con film da 1 mg di colore rosso, ovale, con impresso “Pfizer” su un lato e “1 XNB” sull’altro lato.

Compressa rivestita con film da 3 mg di colore rosso, rotonda, con impresso “Pfizer” su un lato e “3 XNB” sull’altro lato.

Compressa rivestita con film da 5 mg di colore rosso, triangolare, con impresso “Pfizer” su un lato e “5 XNB” sull’altro lato.

Compressa rivestita con film da 7 mg di colore rosso, romboidale, con impresso “Pfizer” su un lato e “7 XNB” sull’altro lato.

Come si conserva Inlyta®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Inlyta®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Inlyta®?

- Assuma la dose prescritta al mattino e alla sera a distanza di circa 12 ore con un bicchiere d'acqua.
- Le compresse possono essere prese con o senza cibo.
- Non divida, sciogla o trituri le compresse, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- Non assuma più tardi la dose dimenticata.
- Prenda la dose successiva come d'abitudine.
- Non assuma una dose doppia per compensare la dimenticanza.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- Non assuma il farmaco un'altra volta.
- Proseguo la terapia il giorno successivo, attenendosi al consueto orario di somministrazione.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Contatti l'équipe curante per farsi prescrivere la dose di somministrazione successiva.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Dolori articolari/muscolari

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.
- Si ricordi di riferire tali sintomi al Suo medico in occasione della prossima visita medica.

Nausea/vomito/inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci che Le sono stati prescritti contro tali effetti secondari.
- Contatti il Suo medico qualora tali effetti secondari si aggravassero o perdurassero oltre 24 ore.

Diarrea

- Assuma tempestivamente la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Consigliamo di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Stitichezza

- In caso di stitichezza persistente chiedi alla Sua équipe curante di indicarti un lassativo idoneo.

Mal di testa

- Sono consentiti gli antidolorifici da banco di uso corrente (p. es. Paracetamolo), non soggetti a prescrizione medica.
- Se i sintomi persistono, contatta l'équipe curante.

Eruzioni cutanee, arrossamenti

- Curi la pelle come consigliato dall'équipe curante.
- Non faccia uso di prodotti per la cute non espressamente consentiti dall'équipe curante.

Cambiamento del tono di voce

- Sono spesso descritti con Inlyta® e di solito sono innocui.

Stanchezza, difficoltà di concentrazione

- In caso di difficoltà di concentrazione e/o di stanchezza insolita faccia particolare attenzione quando guida o utilizza macchinari.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Difficoltà a respirare, gambe gonfie o forte mal di testa.
- In caso di sanguinamenti.
- Faccia controllare la pressione sanguigna almeno una volta alla settimana, in caso abbia valori superiori a 145/85 contatti l'équipe curante.
- Disturbi persistenti o di origine sconosciuta.

Il Suo medico deve sapere in precedenza quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.