

Information pour les patients

Iressa® (Gefitinib)

Arimidex® a été choisi pour vous par votre médecin. Vous pouvez influencer positivement le traitement en suivant les informations suivantes.

Comment se présente Iressa®?



Iressa® comprimés filmés à 250 mg: Comprimés bruns, ronds, marqués d'un côté avec «IRESSA 250».

Comment conserver Iressa®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Iressa® doit être utilisé?

Prenez les comprimés filmés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Iressa®?

- Prenez les comprimés en une prise par jour avec un verre d'eau, de préférence toujours à la même heure.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture.
- Vous pouvez dissoudre les comprimés entiers dans un demi verre d'eau non gazeuse en remuant avec une cuillère jusqu'à dissolution complète. Boire de suite. Puis remplir le verre d'eau et le boire également.

Qu'est-ce que je fais si ...

... j'ai oublié le médicament?

- Vous pouvez encore prendre les comprimés le même jour.
- Ne prenez jamais deux doses journalières le même jour.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- Continuez le traitement le lendemain sans changement.

... j'ai pris trop de comprimés filmés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents?

Que puis-je faire?

Diarrhées

- Prenez sans tarder du Lopéramide (p.ex. Imodium®) selon prescription.
- Lors de diarrhées légères, adaptez votre nourriture en mangeant du riz, des bananes et du pain blanc.
- Buvez environ 2 litres par jour (p.ex. eau, thé, bouillon).

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.

Modifications de la peau

(parfois éruption similaire à l'acné ou peau sèche, en partie irritante)

- Suivez les instructions pour les soins de peau données par votre équipe soignante.
- N'utilisez aucun produit sans avoir consulté votre équipe soignante.

Conjonctivite, inflammation des paupières

- Utilisez plusieurs fois par jour des gouttes oculaires pour humidifier. Portez des lunettes à soleil à l'extérieur. Les paupières enflammées et irritées peuvent être calmées avec des compresses froides.

Inflammation de la muqueuse buccale

- Rincer la bouche au minimum après chaque repas avec de l'eau ou de l'eau salée (1/2-1 c à t./litre d'eau).
- Sans amélioration et si vous avez de la peine à boire ou à manger, contactez votre équipe soignante.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- Si vous avez des saignements de nez ou du sang dans l'urine.
- Si vous souffrez d'essoufflement et/ou de palpitations, éventuellement accompagnés de toux et de fièvre.
- Si la diarrhée ne peut être stoppée avec la prise de Lopéramide (p.ex. Imodium®) à la dose prescrite, soit avec un maximum de 8 gélules/comprimés par jour.
- En cas de symptômes aux yeux.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.
- Les produits suivants peuvent interférer avec l'effet du médicament:
Les préparations à base de pamplemousse, millepertuis.
Abstenez-vous donc de consommer ces produits pendant le traitement.
- Les médicaments inhibant l'acide gastrique peuvent aussi interférer avec l'effet du médicament. Vous ne devriez pas prendre ces médicaments durant le traitement.

Personnes de contact

Médecin

Infirmières

Pharmacie

Urgences

Remarques

Cette fiche informative réalisée par des professionnels vise à faciliter l'utilisation du médicament aux personnes concernées et à leurs proches. Elle est un complément à la notice d'emballage et à l'information professionnelle.

Version: Décembre 2013
Référence: www.swissmedicinfo.ch

© Société Suisse d'Oncologie Médicale/Soins en Oncologie Suisse