

Comment conserver Jakavi®?

Entreposez le médicament à l'air ambiant.

A quelle dose Jakavi® doit être utilisé?

Prenez les comprimés à la dose prescrite par votre médecin.

Comment dois-je prendre Jakavi®?

- Prenez les comprimés avec un verre d'eau, matin et soir.
- Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture. Avalez les comprimés en entier.
- Ne pas mâcher, casser, ouvrir ou écraser les comprimés.

Qu'est-ce que je fais si ...

... j'ai oublié le médicament?

- Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle.
- Ne prenez jamais deux doses en même temps.
- Notez cette date.

... j'ai vomi le médicament?

- Ne prenez pas de nouveaux comprimés le même jour.
- La dose prochaine est prise à l'heure fixée le même soir ou le lendemain matin.

... j'ai pris trop de comprimés?

- Contactez votre équipe soignante pour fixer la prochaine prise.

Quels sont les effets indésirables fréquents ?

Que puis-je faire?

Maux de tête

- Les antidouleurs en vente libre sont autorisés (p.ex. Paracétamol).
- Si les symptômes persistent, consultez votre équipe soignante pour d'autres mesures appropriées.

Essoufflement ou vertiges

- Contactez votre équipe soignante sans attendre.

Douleurs en urinant

- Contactez votre équipe soignante sans attendre.

Eruptions cutanées

- Contactez votre équipe soignante.

Nausées, vomissements

- Prenez les médicaments prescrits sans attendre.

En combinaison avec d'autres médicaments, d'autres effets secondaires peuvent apparaître.

Quand dois-je informer mon équipe soignante?

- En cas de fièvre supérieure à 38°C.
- En cas de saignements – du nez par ex. – ou si vous avez du sang dans les urines.
- Si vous souffrez de symptômes persistants ou inexplicables.

Votre médecin a besoin de connaître quels médicaments ou préparations (y compris à base de plantes) vous prenez. Apportez-en la liste lors de votre prochaine visite.

Que dois-je encore savoir?

- Pendant le traitement, vous ne devez pas absorber de préparation à base de pamplemousse. Ces produits peuvent interférer avec l'effet du Jakavi®.
- Abstenez-vous donc de consommer du grapefruit pendant le traitement.
- N'interrompez pas le traitement sans consulter votre médecin.